

水晶体再建術(2泊3日)

月日		入院・手術当日(手術前)	入院・手術当日(手術後)	術後1日目	術後2日目・退院
項目		/	/	/	/
投薬	点眼	<input type="checkbox"/> ミドリンP、ネバナック(右眼・左眼) <input type="checkbox"/> 1時間前(:) <input type="checkbox"/> 30分前(:) <input type="checkbox"/> 出室時(:) ベノキシール(両眼) <input type="checkbox"/> 出室時(:) <input type="checkbox"/> OPチェックリスト作成 <input type="checkbox"/> 手術室に持参(ベノキシール、ミドリンP、ベガモックス、カップ、テープ) <input type="checkbox"/> 2件目以降の出棟前点眼はONコール	<input type="checkbox"/> レボフロキサシン(持参) 19時 <input type="checkbox"/> 0.1%リンデロン 19時 <input type="checkbox"/> ネバナック(持参分) 19時 <input type="checkbox"/> 点眼後に、ガーゼ除去しカップのみ貼用 <input type="checkbox"/> 深夜で指示簿確認	<input type="checkbox"/> ミドリンP(右眼・左眼) 7時 散瞳しているか確認 <input type="checkbox"/> レボフロキサシン 診察時、12時、19時 <input type="checkbox"/> 0.1%リンデロン 診察時、12時、19時 <input type="checkbox"/> ネバナック 診察時、12時、19時 <input type="checkbox"/> 自己点眼の確認(昼・夕)	
	内服		<input type="checkbox"/> セフゾン100mg毎食後(Cr 2.0以上は中止) 夕食後より開始(3日間で終了)		
点滴		<input type="checkbox"/> 出室前に、生食100mlでルート <input type="checkbox"/> 22か24Gでルート確保 部位はどこでも可	<input type="checkbox"/> 帰室後、体調不良なければ抜去		
食事		<input type="checkbox"/> 常食/() 術前2時間前から絶食	<input type="checkbox"/> 帰室15分経過後、摂食可		
安静度		<input type="checkbox"/> 特になし <input type="checkbox"/> 出棟時は検査着でズボン着用可 <input type="checkbox"/> 車いす+点滴棒	<input type="checkbox"/> 帰室後2時間ベッド上安静(トイレ歩行可) <input type="checkbox"/> 2時間経過後、安静解除・更衣		
清潔		<input type="checkbox"/> 特になし <input type="checkbox"/> OP前に洗顔	<input type="checkbox"/> 入浴・シャワー禁止	<input type="checkbox"/> 首から下のシャワー可 <input type="checkbox"/> 電気カミソリ使用可	
持参薬		<input type="checkbox"/> 続行 <input type="checkbox"/> 術眼の点眼は止め			
		<input type="checkbox"/> 入院診療計画書渡しスキャン <input type="checkbox"/> OP同意書預かりスキャン		<input type="checkbox"/> 高齢者機能評価 コスト	<input type="checkbox"/> 退院指導パンフレット使用し説
		<input type="checkbox"/> カップ テープ アイコットン持参確認 <input type="checkbox"/> 持参薬 点眼薬確認 <input type="checkbox"/> 高齢者機能評価	<input type="checkbox"/> ベガモックスの薬袋が残っていれば廃棄する		<input type="checkbox"/> ミドリンP ベノキシールは廃棄 <input type="checkbox"/> ENT処方を使用している分が終了してから使用するよう説明