

## 網膜硝子体手術

項目	月日	入院・手術当日(手術前)	入院・手術当日(手術後)	術後1日目	術後2日目	術後3日目	術後4日目～退院	
		/	/	/	/	/	/	
投薬	点眼	ミドリンP、ネバナック(右眼・左眼) <input type="checkbox"/> 1時間前( : ) <input type="checkbox"/> 30分前( : ) <input type="checkbox"/> 出室時( : )  ベノキシール(両眼) <input type="checkbox"/> 出室時( : ) <input type="checkbox"/> OPチェックリスト作成 <input type="checkbox"/> 手術室に持参(ベノキシール、ミドリンP、ベガモックス、カッペ、テープ) <input type="checkbox"/> 2件目以降の出棟前点眼はONコール	レボフロキサシン(持19時 <input type="checkbox"/> 0.1%リンデロン 19時 <input type="checkbox"/> ネバナック(持参分) 19時  点眼後に、ガーゼ除去しカッペのみ着用 <input type="checkbox"/> 深夜で指示簿確認	ミドリンP(右眼・左眼) 7時 散瞳しているか確認  レボフロキサシン 診察時、12時、19時 <input type="checkbox"/> 0.1%リンデロン 診察時、12時、19時 <input type="checkbox"/> ネバナック 診察時、12時、19時  ※診察のない日は、ミドリンPはなし。 診察時の点眼は、7時に。  <input type="checkbox"/> 自己点眼の確認(昼・夕)				
	内服		セフゾン100mg毎食後(Cr 2.0以上は中止) 夕食後より開始(3日間で終了)			口屋で終了		
点滴		<input type="checkbox"/> 出室前に、生食100mlでルート <input type="checkbox"/> 22か24Gでルート確保 部位はどこでも可	帰室後、体調不良なければ抜去					
食事		<input type="checkbox"/> 常食/( ) 術前2時間前から絶食	帰室15分経過後、摂食可					
安静度		<input type="checkbox"/> 特になし <input type="checkbox"/> 出棟時は検査着でズボン着用可 <input type="checkbox"/> 車いす+点滴棒	帰室後2時間ベッド上安静(トイレ歩行可) <input type="checkbox"/> 2時間経過後、安静解除・更衣  口体位制限 なし・あり (腹臥位・( )側臥位)					
清潔		<input type="checkbox"/> 特になし <input type="checkbox"/> OP前に洗顔	入浴・シャワー禁止	口首から下のシャワー可 <input type="checkbox"/> 電気ひげそり使用可		口洗顔・入浴可 <input type="checkbox"/> カミソリ可 <input type="checkbox"/> 終日カッペなしで可		
持参薬		<input type="checkbox"/> 続行 <input type="checkbox"/> 術眼の点眼は止め						
		<input type="checkbox"/> 入院診療計画書渡しスキャン  <input type="checkbox"/> OP同意書預かりスキャン <input type="checkbox"/> SGAシート作成			口高齢者機能評価コスト	口退院指導パンフレット使用し説明		
		<input type="checkbox"/> カッペ テープ アイコットン持参確認  <input type="checkbox"/> 持参薬 点眼薬確認  <input type="checkbox"/> 高齢者機能評価	ベガモックスの薬袋が残っていれば廃棄する			口ミドリンP ベノキシールは廃棄  <input type="checkbox"/> ENT処方は使用している分が終了してから使用するよう説明		